

**EDIZIONE
ICONOGRAFICA**

ISBN: 978-88-98334-85-8/II

FINASTERIDE *Collection II*

Caretopic
spray cutaneo, soluzione di
finasteride 2,275 mg/mL,
per il trattamento
dell'alopecia androgenetica:
indicazioni e risultati clinici

Dott.ssa Bianca Maria Piraccini
Private Dermatology Practice, Bologna - Italy

OXYS
PUBLISHING

Oxys™ Publishing
Reg. trib. MI n. 342/7-09
Copyright © 2026
All rights reserved
ISBN 978-88-98334-85-8/II



Stampato in Italia su carta ecologica FSC, nel rispetto del *Forest Stewardship Council*
per la gestione forestale responsabile e la tracciabilità dei prodotti derivati.

Prefazione

Questa rappresenta la seconda raccolta iconografica di casi clinici che mostra l'efficacia clinica di Caretopic spray cutaneo, soluzione topica di finasteride 2,275 mg/mL in associazione a Carexidil 5%, spray cutaneo Minoxidil 5%, in pazienti di entrambi i sessi affetti da alopecia androgenetica.

Caretopic, spray cutaneo, soluzione topica di finasteride 2,275 mg/mL è già in commercio in Italia da più di 2 anni, e ne conosciamo bene le indicazioni, la tollerabilità e l'efficacia.

Come sempre, quando si dispone di una nuova terapia, nella pratica clinica la si utilizza in modo più esteso dell'indicazione del foglietto illustrativo, ottenendo spesso ottimi risultati.

La facilità di applicazione del prodotto lo rende infatti di facile utilizzo anche in associazione a trattamenti orali o topici, e ci ha permesso di verificare l'elevata efficacia della finasteride topica nel trattamento dell'alopecia androgenetica in vari schemi terapeutici.

In questa seconda raccolta presenteremo le esperienze cliniche di due tipologie di pazienti:

- Donne con alopecia androgenetica in età fertile in terapia con contraccettivo/in menopausa ed in trattamento con Caretopic spray cutaneo, soluzione topica di finasteride 2,275 mg/mL in associazione a Carexidil 5% spray cutaneo.
- Pazienti maschi con alopecia androgenetica in trattamento con Caretopic spray cutaneo (Caretopic spray cutaneo, soluzione topica di finasteride 2,275 mg/mL) in associazione a Carexidil 5% spray cutaneo.

Bianca Maria Piraccini

Donne in età fertile in terapia con contraccettivo o donna in menopausa in trattamento con Caretopic spray cutaneo, soluzione topica di finasteride 2,275 mg/mL in associazione a Carexidil 5%

1° caso

Paziente di 41 anni con diagnosi di alopecia androgenetica da 1 anno, che ha sperimentato progressivo diradamento nella zona del vertex. Assume da 5 anni un contraccettivo orale combinato. In seguito a visita dermatologica, le viene consigliato l'uso di Caretopic spray cutaneo, soluzione topica di finasteride 2,275 mg/mL, da applicare con 1 spruzzo (50 µL) al giorno sul vertex. In parallelo, inizia Carexidil 5% spray cutaneo, con 10 erogazioni distribuite su tutto il cuoio capelluto (pari a 1mL di soluzione), preferibilmente di sera, per evitare interferenze con l'assorbimento.



T0: Prima visita.



*T1: Il trattamento combinato con Caretopic e Carexidil 5% ha portato a risultati incoraggianti, con una **visibile ripresa della crescita capillare e un miglioramento globale del quadro clinico e tricoscopico**. Il trattamento viene esteso per altri 6 mesi.*

2° caso

Paziente di 60 anni che soffre di alopecia androgenetica da circa 15 anni, con evidenti aree di diradamento soprattutto nella regione della corona e della zona frontotemporale. Ha già provato diverse terapie senza miglioramento. Sotto indicazione dermatologica, inizia l'applicazione di Caretopic spray cutaneo, soluzione topica di finasteride 2,275 mg/mL con 3 erogazioni (150 μ L) concentrate in aree diverse di maggiore diradamento, una volta al giorno. Integra con Carexidil 5% spray cutaneo (pari a 1mL di soluzione), con 10 erogazioni distribuite omogeneamente sul cuoio capelluto. L'applicazione avviene la sera per entrambi i prodotti per motivi personali.



T0: Prima visita.



*T1: La risposta al trattamento con Caretopic e Carexidil 5% è stata favorevole, con un **notevole miglioramento clinico e tricoscopico, accompagnato da un recupero estetico visibile**. La paziente è entusiasta di continuare la terapia combinata dati i risultati.*

3° caso

Paziente di 38 anni affetta da alopecia androgenetica da circa 3 anni, senza precedenti patologie rilevanti. In passato non ha mai eseguito terapia per la calvizie. Da 7 anni assume un contraccettivo estroprogestinico. Dopo valutazione dermatologica, inizia il trattamento con Caretopic spray cutaneo, soluzione topica di finasteride 2,275 mg/mL, con 1 applicazione giornaliera di 2 erogazioni (100 µL) distribuite sulle aree più diradate del cuoio capelluto. Al mattino applica anche Carexidil 5% spray cutaneo, con 10 erogazioni su tutto il cuoio capelluto (pari a 1mL di soluzione), senza massaggiare. L'applicazione dilazionata tra i due prodotti, Caretopic la sera e Carexidil al mattino, è raccomandata per massimizzare l'assorbimento.



T0: Prima visita.



*T1: La combinazione di Caretopic e Carexidil 5% applicata quotidianamente per sei mesi ha determinato un **miglioramento clinico e tricoscopico apprezzabile, con una copertura capillare più densa e fusti più robusti**. Si opta collegialmente di persistere con questo schema terapeutico.*

4° caso

Donna di 40 anni con storia di alopecia androgenetica da circa 2 anni, già trattata con varie soluzioni senza risultati apprezzabili. La paziente assume da più di 10 anni contraccettivo orale estroprogestinico. Su consiglio dermatologico, inizia l'applicazione Caretopic spray cutaneo, soluzione topica di finasteride 2,275 mg/mL, 1 applicazione al giorno in 2 erogazioni (100 µL totali) sul cuoio capelluto, cercando di distribuire la soluzione sulle aree di maggiore diradamento. La paziente farà in associazione anche Carexidil 5% spray cutaneo, 10 erogazioni su tutto il cuoio capelluto senza massaggiare (pari a 1mL di soluzione), una volta al giorno. L'applicazione dilazionata tra i due prodotti, Caretopic la sera e Carexidil al mattino, è raccomandata per un assorbimento ottimale e facilitare l'applicazione dei due prodotti.



T0: Prima visita.



*T1: Dopo sei mesi di trattamento combinato con Caretopic e Carexidil 5%, si osserva un **miglioramento clinico evidente, documentato anche dalla valutazione tricoscopica.** La paziente desidera quindi proseguire il trattamento.*

5° caso

Paziente di 40 anni con alopecia androgenetica diagnosticata 2 anni fa, con diradamento diffuso in tutto il cuoio capelluto, più marcato nelle zone del vertex. La paziente non ha mai eseguito trattamenti ad hoc per la propria condizione. Assume contraccettivo combinato da 13 anni. Su consiglio dermatologico, inizia Caretopic spray cutaneo, soluzione topica di finasteride 2,275 mg/mL, 1 spruzzo al giorno in tre erogazioni (150 µL totali) distribuite sulle aree maggiormente colpite. Aggiunge Carexidil 5% spray cutaneo, con 10 erogazioni su tutto il cuoio capelluto (pari a 1mL di soluzione), evitando di massaggiare, e preferendo l'applicazione serale per ottimizzare l'assorbimento dei principi attivi.



T0: Prima visita.



*T1: Si è registrata una **risposta clinica marcata dopo sei mesi di trattamento, con un miglioramento evidente nella densità e nella qualità dei capelli**, rilevato sia clinicamente che attraverso la tricoscopia. Si decide di rivalutare a 12 mesi la situazione clinica e tricoscopica per constatare eventuali ulteriori miglioramenti.*

Pazienti maschi in trattamento con Caretopic spray cutaneo, soluzione topica di finasteride 2,275 mg/mL in associazione a Carexidil 5% spray cutaneo

1° caso

Paziente di 35 anni con diradamento nella regione del vertex e una moderata recessione frontotemporale. La diagnosi di alopecia androgenetica risale a 8 anni fa. Su indicazione del dermatologo, inizia con Caretopic spray cutaneo, soluzione topica di finasteride 2,275 mg/mL, applicando 1 volta al giorno (tre erogazioni pari a 150 µL) concentrato soprattutto nella regione della corona. Integra Carexidil 5% spray cutaneo applicata in 10 erogazioni due volte al giorno (mattina e sera) su tutto il cuoio capelluto.



T0: Prima visita.



*T1: La combinazione di Caretopic e Carexidil 5% ha determinato un miglioramento della copertura capillare, con un **incipiente incremento della densità e dello spessore dei capelli**. Si decide quindi di rivalutare il paziente a 12 mesi per monitorare ulteriori margini di progressione.*

2° caso

Paziente di 27 anni con alopecia androgenetica, diagnosticata da un anno. Presenta un diradamento nelle zone frontotemporali, con un'attaccatura leggermente arretrata, ma conserva un buon volume nelle aree posteriori e sulla sommità del capo. Il paziente decide di intraprendere un trattamento topico sotto la supervisione dermatologica con Caretopic spray cutaneo, soluzione topica di finasteride 2,275 mg/mL, quattro erogazioni (200 µL totali) applicate nelle aree frontotemporali; applica inoltre Carexidil 5% spray cutaneo, 10 erogazioni su tutto il cuoio capelluto due volte al giorno, una al mattino e una alla sera. Evita il massaggio. La finasteride viene applicata prima di cena per garantire un intervallo di applicazione con il minoxidil.



T0: Prima visita.



*T1: La combinazione terapeutica con Caretopic e Carexidil 5% ha portato a una **risposta clinica e tricoscopica positiva**, con un **aumento della copertura capillare e un miglioramento della qualità dei fusti**. Il paziente continuerà l'approccio terapeutico in atto.*

3° caso

Paziente di 33 anni con alopecia androgenetica moderata, diagnosticata circa 15 anni fa, presenta un diradamento maggiore sulla sommità del capo e lieve recessione frontale. Ha eseguito un ciclo di 2 settimane di terapia con finasteride orale in passato, sospesa per calo della libido. Su consiglio dermatologico, avvia una terapia topica composta da Caretopic spray cutaneo, soluzione topica di finasteride 2,275 mg/mL, 4 erogazioni (200 µL totali) da applicare ogni sera nelle aree maggiormente diradate. Aggiunge Carexidil 5%, 10 erogazioni, su tutto il cuoio capelluto, la mattina appena sveglio e la sera prima di dormire, evitando massaggi. Le applicazioni di finasteride e minoxidil sono distanziate di almeno 6 ore.



T0: Prima visita.



*T1: Dopo sei mesi di terapia quotidiana con Caretopic e Carexidil 5%, il quadro clinico mostra una **crescita capillare più densa e fusti più robusti**, come confermato dalla tricoscopia. L'aspetto estetico è più gradevole e il paziente decide quindi di continuare la terapia.*

4° caso

Paziente di 45 anni con alopecia androgenetica diagnosticata 10 anni fa, con diradamento diffuso in tutto il cuoio capelluto, più marcato nelle zone frontotemporali. Il paziente si è rivelato resistente ai soli trattamenti cosmetici effettuati in passato. Su consiglio dermatologico, inizia Caretopic spray cutaneo, soluzione topica di finasteride 2,275 mg/mL, tre erogazioni (150 µL totali) distribuite sulle aree maggiormente colpite. Aggiunge Carexidil 5% spray cutaneo, con 10 erogazioni su tutto il cuoio capelluto, due volte al giorno, evitando di massaggiare. Il paziente applicherà il Carexidil al mattino e alla sera dopo la doccia, mentre Caretopic verrà erogato dopo pranzo, in maniera tale da distribuire meglio le applicazioni dei vari farmaci durante la giornata.



T0: Prima visita.



*T1: Dopo sei mesi di trattamento con Caretopic e Carexidil 5%, si osserva un miglioramento clinico, con un **aumento della densità capillare e una crescita uniforme rilevata alla tricoscopia**. Al paziente è stato anche prescritto uno shampoo antiforfora a base di ciclopiroxolamina, che contribuirà a migliorare la salute del cuoio capelluto.*

5° caso

Paziente di 38 anni con alopecia androgenetica, con diradamento soprattutto nelle aree frontotemporal con lieve diradamento sul vertex. La diagnosi è stata fatta 6 anni fa. Ha effettuato terapia con minoxidil per bocca, sospesa per insorgenza di ipotensione e edema delle gambe. Avvia quindi un trattamento con Caretopic spray cutaneo, soluzione topica di finasteride 2,275 mg/mL, 4 erogazioni (150 µL totali) da applicare la mattina nelle aree frontotemporal. Si aggiunge Carexidil 5% che viene applicato due volte al giorno con 10 erogazioni distribuite uniformemente su tutto il cuoio capelluto. Si raccomanda di non massaggiare e di applicare finasteride e minoxidil a distanza di circa 6-8 ore l'uno dall'altro.



T0: Prima visita.



*T1: Dopo sei mesi di trattamento con Caretopic e Carexidil 5%, la tricoscopia evidenzia un **miglioramento globale, con capelli più numerosi e robusti**. Si opta per la continuazione della terapia.*



OXYS
PUBLISHING